



SVENSKA  
KENNELKLUBBEN  
HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

# Mops

## Kraniofacialkvot större än 0,3.

Mindre relativ noslängd tydlig riskfaktor för BOAS. 0.3 är ett minimimått inte ett ideal

## Mindre bredd mellan ögonen

Brett mellan ögonen är en tydlig riskfaktor för BOAS hos mops

## Icke utstående och ej klotrunda ögon

Utstående ögon (grunda ögonhålor) ökar risk för ögonskador

## Helt öppna näsborrar

Knipna/stenotiska näsborrar är en tydlig riskfaktor för BOAS hos mops

## Något längre och smalare hals

Bredare och kortare hals /nacke är en riskfaktor för bl a BOAS

## Något längre och mindre bred skalle

Kort och bred skalle är en tydlig riskfaktor för bl a BOAS hos mops



## Synlig midja och med revben som är lätt kännbara.

Övervikt är en riskfaktor för BOAS hos mops.

## Något längre rygg, mindre kompakt kropp

Kort rygg är en riskfaktor för ryggproblem och kan försvåra att utföra naturliga funktioner

## Hud utan rynkor, ett litet antal mindre rynkor kan förekomma på huvudet

Rynkig och överdriven mängd hud. Rynkor kan ge irritationer och inflammationer. Nosrynka kan även störa ögon och andning.